

УДК 599.323.4:591.11 + 504.5:621.039.7

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Тарахтий Э.А., Жигальский О.А.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
e-mail: tar@ipae.uran.ru; zig@ipae.uran.ru

Исследованы количество клеток и клеточный состав крови и кроветворных органов мелких млекопитающих (*Mus musculus*, *Apodemus sylvaticus*, *Clethrionomys rutilus*) с территорий, подвергшихся радиационному влиянию (Восточно-Уральский радиоактивный след, Свердловская область, Тощкий радиоактивный след, Оренбургская область). Установлены изменения состава и структуры клеток крови, клеточного состава и концентрации клеток кроветворной ткани в зависимости от вида животных и места их обитания. Влияние на организм мышей и полевок радиационного фактора среды подтверждает обнаружение в тушках животных радионуклидов.

Ключевые слова: радиационное загрязнение среды, мелкие млекопитающие из природных популяций, состав и структура клеток крови и кроветворных органов

ASSESSMENT THE HEMATOPOIETIC SYSTEM IN SMALL MAMMALS FROM AREAS WITH LOW RADIATION POLLUTION

Tarakhtii E.A., Zhigalski O.A.

Institute of Plants and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences,
Yekaterinburg, e-mail: tar@ipae.uran.ru; zig@ipae.uran.ru

We studied the number and cellular composition in blood counts and blood-forming organs of small mammals (*Mus musculus*, *Apodemus sylvaticus*, *Clethrionomys rutilus*) from areas exposed to irradiated action (East Ural Radioactive Trace, Sverdlovsk region, Totsky radioactive trail, Orenburg region). Changes of the composition and structure of blood cells, of the cellular composition and the concentration of cells in hematopoietic tissue depended on the species and habitats animal. The identified radionuclides in animal confirms the impact on the body of mice and voles radiation factor environment.

Keywords: radiation pollution, small mammals from natural populations, the composition and structure of blood cells and blood-forming organs

В условиях глобальной антропогенной нагрузки на компоненты природной среды значительное место занимают проблемы радиоактивного загрязнения. Низко интенсивному радиационному прессу подвергаются природные комплексы Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС, Свердловская обл.) и Тощкого радиоактивного следа (ТРАС, Оренбургская обл.), где дозообразующими радионуклидами в современных условиях являются долгоживущие ^{90}Sr и ^{137}Cs [5, 6, 7, 9]. Полураспад и полное исчезновение основного загрязнителя ^{90}Sr займет многие годы [9]. В связи с этим оценка влияния малых доз излучения на животный организм и его ответ на условия загрязненной среды является актуальной.

В качестве биоиндикаторов состояния природной среды часто используют мелких млекопитающих. В случае обитания животных в условиях повышенного радиоактивного загрязнения среды нет четкого представления о радиорезистентности организма млекопитающих. Ответ на воздействие поступающих в организм токсиантов зависит от концентрации, их состава, длительности действия, видовой специфики

организмов и других факторов способных вызывать отклонение от нормы различных показателей. Действие малых доз радиационной или химической природы сложно оценить, но чрезвычайно важно, поскольку из неспецифических проявлений на начальном этапе поражения оно может изменить реактивное состояние организма и перейти в специфические. Оценить влияние на живой организм экологических факторов, его ответ на внешние воздействия позволяет изучение системы кроветворения, комплексная оценка количества, качества, состава клеток крови и кроветворных органов [4, 8].

Задача исследования – оценить по комплексу количественных и структурных показателей, клеточного состава крови и кроветворных органов мелких млекопитающих влияние низкого уровня радиационного загрязнения среды.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служили достаточно одородные по репродуктивному статусу, отловленные в июле–августе 1993–1994 гг., *Apodemus sylvaticus* (19 особей, из них 13 самцов, бсамок) и *Clethrionomys rutilus* (9 особей: 5 самцов и 4 самки) из окрестностей озера Тыгиш, расположенного в буферной

зоне ВУРСа [7] и *Mus musculus* (21 особь: 10 самцов и 11 самок) с территории пос. Старобогдановка, расположенной по осевой части ТРАСа [6]. Контрольные участки находились за пределами следа: Большая Грязнуха с ВУРСа (8 особей *Ap. sylvaticus*, из них 5 самцов и 3 самки, 9 особей *Cl. rutilus*, 4 самца и 5 самок) и Кристалка с ТРАСа (14 особей *M. musculus* – 9 самцов и 5 самок).

У каждого животного определяли параметры крови (концентрацию и клеточный состав, гемоглобин, гематокрит, осмотическую резистентность эритроцитов в растворах 0,85–0,1 % NaCl и 16, 50 и 84 % гемолиз), параметры эритроцитов (средний диаметр, объем, содержание и концентрацию гемоглобина в эритроците, толщину, площадь поверхности эритроцитов, концентрацию гемоглобина на единицу площади поверхности), способность крови переносить кислород единицей объема. Определяли массу и клеточность селезенки, концентрацию и состав клеток костного мозга бедренной кости, пролиферативную активность, индексы созревания эритроцитов и гранулоцитов.

Определяли содержание радионуклидов в зольном остатке костно-мышечной ткани каждой тушки (с удаленными органами и черепом): суммарную бета-активность рассчитанную по ^{90}Sr , содержание ^{137}Cs и ^{90}Sr для каждой выборки. Детально метод описан в работе [6].

Полученные данные анализировали с помощью “Statistica for Windows” (дисперсионный, ковариационный анализ), при оценке различий показателей использовали Tukey-тест для разного числа животных.

Результаты исследования и их обсуждение

Комплексное радиэкологическое обследование территорий ВУРСа и ТРАСа выявило превышение уровней ^{137}Cs и ^{90}Sr контрольных участков, гамма-фон в зоне ТРАСа и ВУРСа соответствуют пределам колебаний в контрольном регионе, дозобразующими радионуклидами в современных условиях являются долгоживущие ^{90}Sr и ^{137}Cs [5, 6, 9]. Плотность загрязнения цеэзем почв ТРАСа превышала уровень глобальных выпадений (в 1,5–3 раза), стронцием – не отличалась от фоновых значений. Превышало уровень глобальных выпадений (в 1,5–5 раз) содержание плутония [5, 6]. Содержание ^{90}Sr в костно-мышечной ткани домовых мышей опытной группы превышало значения контрольной группы ($12 \pm 1,2$ против $4,9 \pm 0,9$ Бк/кг сухой массы), содержание ^{137}Cs не различалось ($18,5 \pm 5$ против 15 ± 5 Бк/кг), бета-активность составила 256,3 против 231,3 Бк/кг сухой массы в контроле.

Радиэкологический мониторинг территорий ВУРСа [9] выявил пятнистую структуру загрязнений: при средней плотности 0,5–1 Ки/км² найдены отдельные аномалии по ^{90}Sr (2–3 Ки/км²) и ^{137}Cs (до 0,5 Ки/км²). Более высокие концентрации ^{90}Sr

и ^{137}Cs найдены в костно-мышечной ткани животных с опытного участка по сравнению с контрольным (^{137}Cs в 1,5 раза у красной полевки и в 1,9 раза у лесной мыши, ^{90}Sr в 6,1 у красной полевки и в 3,6 раза у лесной мыши), при этом у красной полевки содержание ^{90}Sr и ^{137}Cs больше (в 2,2 и в 1,3 раза), чем у лесной мыши [6]. Уровень бета-активности у лесной мыши с импактной территории составил 112 Бк/кг против 31 Бк/кг в контроле, у красной полевки – 248 и 41 Бк/кг сухой массы. У лесной мыши с ТРАСа уровень бета-активности составил $305,0 \pm 7,6$ Бк/кг, у красной полевки из окрестностей оз. Тыгиш и ТРАСа уровни были близки [6].


По данным ряда авторов столь незначительные загрязнения радионуклидами почвенно-растительного покрова не должны вызывать каких-либо изменений на уровне экосистем или клеток [2, 3]. Однако обнаружены изменения на растительных объектах [7], выявленные радионуклиды в тушках мышей и полевок с территорий ТРАСа и ВУРСа свидетельствуют о факте облучения организма и протекании жизнедеятельности животных в условиях радиоактивного загрязнения. С помощью ковариационного анализа мы установили влияние радионуклидов на показатели селезенки, диаметр эритроцитов, концентрацию гемоглобина и костного мозга у животных опытной группы, не найдено связи ни с одним из исследованных показателей в контрольной выборке. Исследование комплекса параметров системы крови мелких млекопитающих с применением многомерного дисперсионного анализа выявило влияние на изменчивость места обитания ($R\text{-Pao}_{10,42} = 1,897, p < 0,07$), вида животных ($R\text{-Pao}_{20,84} = 2,634, p < 0,001$) и взаимодействия факторов ($R\text{-Pao}_{20,84} = 2,106, p < 0,01$).

Концентрация эритроцитов, гемоглобина и гематокрит в крови, традиционно используемые при оценке состояния среды, у животных с загрязненной территории существенно не изменяются, лишь у красной полевки больше эритроцитов (11,9 против 8,4 млн/мкл в контроле, $p < 0,01$). Однако во всех выборках животных изменяется размерный состав, структура и свойства эритроцитов, что более важно в оценке патологических нарушений. Так, у домовых мышей с импактного участка (рисунок, а) кривая распределения эритроцитов сдвинута в сторону клеток большего диаметра ($R\text{-Pao}_{14,11} = 57,185, p < 0,001$), что указывает на появление в крови молодых клеточных


форм. Эритроциты этих мышей большего диаметра и меньшей толщины (7,2 против 5,3 мкм и 1,3 против 2,4 мкм, $p < 0,05$), что делает их более стойкими в изотонических растворах, существенно возрастает (213% от контроля) способность переносить кислород единицей объема крови.

У лесных мышей с ВУРСа отмечена тенденция к изменению параметров эритроцитов, увеличивается дисперсия размерного состава (рисунок а). У красной полевки при некотором сдвиге кривой в сторону клеток меньшего диаметра эритроциты меньшего ($p < 0,05$) объема (46

против 79 мкм³), с меньшим содержанием гемоглобина (15 против 22 пг) по сравнению контрольными животными и мышами (лесной и домовый), несколько меньше, чем у контрольных ($p > 0,05$) средний диаметр (5,7 против 6,2 мкм) и площадь поверхности (63 против 75 мкм²), меньше и диапазон 16, 50 и 84% гемолиза эритроцитов (0,51–0,46% против 0,57–0,41% NaCl у лесной мыши). Можно полагать, что поддержание дыхательной функции крови у красной полевки при измененной структуре и функции клеток компенсирует возросшее число эритроцитов.



а



б

Клеточный состав (% от контроля) эритроцитов (а) и лейкоцитов (б) в крови мышей домовой (1), лесной (2) и красной полевки (3)

Концентрация лейкоцитов между контрольными и импактными выборками животных не различается, лишь у животных с импакта заметна тенденция к возрастанию. Однако в формуле крови отмечен сдвиг влево (рисунок б) и в большей мере у домовых мышей (юных 1,88 против 0,69%, палочкоядерных нейтрофилов 5,38 против 3,18%, $p < 0,05$), при этом возросло общее число нейтрофилов (23,6 против 17,2%). У лесной мыши и красной полевки с импактной территории нейтрофилов в крови меньше, чем у контрольных животных (28,8 против 43% и 21,9 против 29,4%, соответственно). Для суждения о состоянии кроветворения более весомый лимфоцитарно-нейтрофильный показатель, чем общее число лейкоцитов в крови [2]. Величина его у домовых мышей с импакта ниже (2,43 против 3,52), у лесной мыши и красной полевки выше (1,1 против 2,0 и 2,0 против 3,1, соответственно), чем у контрольных особей, что можно связать с особенностями ответной реакции кроветворной системы у этих животных.

Исследуя параметры костного мозга и селезенки установлено, что кроветвор-

ная функция костного мозга зависит от места обитания ($R\text{-Pa}_{24,15} = 2,55$, $p < 0,03$) и вида животных ($R\text{-Pa}_{24,15} = 6,33$, $p < 0,001$). У домовых мышей с загрязненной территории концентрация клеток в костном мозге несколько выше (12,8 против 11,5 млн/бедро) и существенно выше в селезенке (123 против 65 млн/мг массы органа контрольных особей, $p < 0,05$), что, по-видимому, обусловлено активацией лейкопоэза и в большей мере эритропоэза (рисунок), в пользу которого свидетельствует снижение лейко-эритроцитарного профиля (2,4 против 3,5). У красной полевки в условиях загрязненной среды масса и клеточность селезенки составляют 58% от контрольных значений, клеток костного мозга – 66%, у лесной мыши соответственно 131, 119 и 117%.

Исследование парциальной миелограммы выявило возрастание у лесных мышей (в 3 раза) и красной полевки (в 2 раза) с импактной территории митотической активности в эритроидном ряду (уровень ее у лесных мышей в 3 раза выше), у красной полевки в миелоидном ряду (в 1,6 раза). У лесных мышей с импактной территории

больше, чем с контрольной (при $p \leq 0,05$) базофильных нормобластов (в 2 раза) и миелобластов (в 1,4 раза), ретикулярных клеток (в 3 раза) способных регенерировать костный мозг, несколько выше (в 1,6 раза) индекс созревания эритроцитов (отношение орто- и поли- хроматофильных к базофильным нормобластам). У красной полевки в отличие от лесной мыши индекс созревания эритроцитов несколько ниже, чем в контрольной выборке (в 1,2 раза), но выше, чем у лесных мышей ($p \leq 0,05$) индекс созревания нейтрофилов (отношение миелобластов, промиелоцитов, миелоцитов и метамиелоцитов к палочко- и сегментоядерным) за счет меньшего числа палочко- и сегментоядерных форм. Снижение лейко-эритроцитарного профиля у лесных мышей и красной полевки с импактной территории, и в большей мере у последней, свидетельствует о подавлении миелоидного роста. При этом у красной полевки число лимфобластов превышает таковое у лесных мышей (2,21 против 0,88%, $p \leq 0,05$), что вероятно направлено на увеличение реактивности лимфоцитарного звена иммунной системы. Увеличение митотической активности и снижение числа зрелых клеток у лесной мыши и красной полевки с импактной территории указывает на задержку созревания нейтрофилов в костном мозге и снижение их в крови (28,8 против 43% и 21,9 против 29,4% контрольных, соответственно), у домовых мышей их выход в кровь (23,6 против 17,2%), можно полагать, функционально неполноценных клеток.

Заключение

Наблюдаемые количественно-структурные изменения в крови и кроветворных органах у исследованных видов мелких млекопитающих даже в условиях столь низкого радиационного загрязнения среды можно расценивать как проявление компенсаторных возможностей кроветворной системы в ответ на возросшие функциональные нагрузки. Ответная реакция крови и кровет-

ворных органов не одинакова: поддержание дыхательной функции крови у домовых мыши протекает по пути структурных изменений эритроцитов, у красной полевки за счет их количества, у лесной мыши поддерживается активное состояние кроветворения. Понять причину разной изменчивости параметров системы крови позволяет различная концентрация накопленных радионуклидов, у лесных мышей и красной полевки связанная скорее с различным типом их питания. Как более токсичный ^{90}Sr по сравнению с ^{137}Cs локализующийся в костной ткани и в больших количествах у красной полевки, действует на костный мозг и подвывает радиочувствительную кроветворную ткань.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН, проект № 12-П-4-1068, № 12-С-4-1012.

Список литературы

1. Биологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов / В.А. Борисова, Т.М. Воеводина, А.В. Федорова, Н.Г. Яковлева. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 235 с.
2. Вальд Н. Гематологические параметры при остром лучевом поражении // Руководство по радиационной гематологии. – М.: Медицина, 1974. – С. 211–221.
3. Действие ионизирующей радиации на биогеоценоз / Д.А. Криволуцкий, Ф.А. Тихомирова, Е.А. Федоров, А.Д. Покаржевский, А.И. Таскаев. – М.: Наука, 1988. – 240 с.
4. Козинец Г.И., Каюмова Д.Ф., Погорелов В.М. Клетки периферической крови и экологические факторы внешней среды // Клини. лаб. диагностика. – 1993. – № 1. – С. 14–20.
5. Миграция радионуклидов в пресноводных и наземных экосистемах / А.В. Трапезников, И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, В.Н. Трапезникова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – Т. 2. – 400 с.
6. Отдаленные эколого-генетические последствия радиационных инцидентов: Тонкий ядерный взрыв (Оренбургская область, 1954 г.) / под ред. А.Г. Васильева. – Екатеринбург: Екатеринбург, 2000. – 288 с.
7. Современное состояние наземных экосистем Восточно-Уральского радиоактивного следа / В.Н. Позолотина, И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, Л.Н. Михайловская, Е.В. Антонова. – Екатеринбург: Гошицкий, 2008. – 204 с.
8. Тарахтий Э.А., Мухачева С. В. Характеристика системы крови рыжей полевки (*Clethrionomys glareolus*) в градiente хронического химического загрязнения среды // Изв. РАН. Сер. биол. – 2011. – № 5. – С. 603–613.
9. Тетерин А.Ф. Эколого-климатические особенности зоны Восточно-Уральского радиоактивного загрязнения. – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 368 с.